

CARBOSSITERAPIA DI NUOVA GENERAZIONE: UN PROMETTENTE APPROCCIO NON CHIRURGICO AL RINGIOVANIMENTO VULVO-VAGINALE

Dott.ssa Alessandra Scilletta

NOTE SULL'AUTORE

Dott.ssa Alessandra Scilletta, Chirurgo Plastico

La Dott.ssa Scilletta Alessandra ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania e un Diploma post-laurea in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l'Università di Catania.

La Dott.ssa Scilletta è autrice di varie pubblicazioni scientifiche e ha tenuto vari corsi formativi sulla carbossiterapia all'estero.

Ha inoltre lavorato in Spagna per 13 mesi presso il reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Reina Sofia a Cordoba.

Attualmente, la Dott.ssa Scilletta è direttore medico di uno studio chirurgico privato.

INTRODUZIONE

La menopausa spesso porta con sé atrofia o degradazione dei tessuti attorno al perineo, una ridotta risposta agli stimoli, oltre a una perdita di funzionalità e di turgore dei tessuti, e una ridotta sensibilità della zona.

In tutti questi casi è possibile utilizzare la carbossiterapia per un ringiovanimento non chirurgico della vagina.

Il trattamento di carbossiterapia consiste in 5 o 6 microiniezioni di anidride carbonica da effettuarsi nell'area per stimolare la crescita di nuovi capillari nei tessuti.

CONCLUSIONI

I risultati saranno la ripresa della fornitura di sangue, il miglioramento della circolazione e, in tal modo, il ripristino delle funzioni del tessuto ed un aumento della quantità di tessuto nella zona trattata.

Il trattamento è normalmente ben tollerato e dura 5-10 minuti.

Durante la fase iniettiva la paziente potrebbe avvertire un leggero fastidio, la maggior parte delle pazienti

descrive questa sensazione come un leggero calore e pizzicore nella zona trattata.


Per effetto della CO₂, subito dopo il trattamento la zona apparirà leggermente gonfia ma tornerà normale nel giro di una trentina di minuti.

Grazie ai trattamenti di carbossiterapia è possibile migliorare le seguenti condizioni:


- Aspetto estetico della zona trattata, poiché i tessuti riacquistano vigore
- Tono e funzionalità della vagina: il miglioramento della microcircolazione nella zona trattata determina una migliore lubrificazione
- Secchezza e irritazione quotidiane: questi sintomi possono essere ridotti grazie alla migliorata microcircolazione.
- Sensibilità della zona, con possibile incremento dell'attività orgasmica.

Si tratta di una procedura rapida ed il paziente può tornare alle proprie attività subito dopo il trattamento. Gli effetti dei trattamenti sono cumulativi.


A seconda della gravità del problema possono essere necessari da 6 a 10 trattamenti settimanali e un trattamento al mese per il mantenimento.




Prima



Dopo



Prima



Dopo

AMAC 2014 - 1° Congresso Asiatico Medicina Anti-Aging - Singapore
25 - 27 Settembre 2014



EuroMediCom

informa
exhibitions

AMAC
ANTI-AGING MEDICINE ASIAN CONGRESS

JOINT MEETING WITH

aesthetics asia
EXHIBITION & CONGRESS

AESTHETIC & ANTI-AGING MEDICINE CONGRESS & EXHIBITION
Aesthetic Dermatology and Surgery, Preventive and Anti-Aging Medicine

25-27 SEPTEMBER 2014
SINGAPORE, SANDS CONVENTION CENTER

THE ASIAN EVENT FOR "GLOBAL ANTI-AGING MANAGEMENT"



18 CME CREDITS

FINAL PROGRAMME

WWW.EUROMEDICOM.COM
WWW.AESTHETICSASIA.COM

MBE Medical Division - divisione di Maya Beauty Engineering s.r.l. - Via Collamarini 21 - 40138 Bologna
www.mbemedicale.it - info@mayabeauty.it - Tel. 051/782368 - Fax 051/782032