



REVYPEEL[®] HIGH & LOW

Protocolli Medici Ufficiali



Avvertenze Generali

Questo documento contiene i protocolli ufficiali di applicazione ambulatoriale per REVYPEEL® LOW e REVYPEEL® HIGH. È destinato esclusivamente a dermatologi, medici estetici e altri professionisti sanitari qualificati.



Per preservare le proprietà chimico-fisiche del prodotto, non aprire il flacone. Prelevare REVYPEEL® utilizzando una siringa monouso forando il tappo grigio con l'apposito applicatore a punta arrotondata fornito nella confezione.



Applicare una crema SPF 50+ o uno schermo totale alla fine del trattamento per prevenire l'insorgenza di iperpigmentazioni.



Il trattamento può essere effettuato anche durante i mesi estivi. In caso di alte temperature, conservare in frigorifero. Usare a temperatura ambiente.



Indossare sempre guanti in nitrile durante l'applicazione.



Proteggere mucose, area perinasale, contorno occhi, tatuaggi, tagli, lesioni cutanee e lesioni sospette con crema barriera o vaselina.



Iniziare l'applicazione su un'area limitata. Un leggero pizzicore è normale. In caso di bruciore intenso, sospendere subito il trattamento, neutralizzare con REVYSKIN Neutralizing Gel, sciacquare con acqua fredda e applicare REVYSKIN Post Peeling Cream SPF 50+.



Evitare la zona perioculare.



Trattare solo cute integra, lontano da epilazione, rasatura o altre stimolazioni.



Evitare aree con dermatite seborroica.



Evitare gli angoli della bocca (soprattutto in presenza di cheilite angolare) e la zona nasale.



Fare attenzione alla plica sottomammaria per il rischio di fissurazioni da macerazione.



Su pelle acneica o grassa e in aree delicate, limitarsi a massimo 3 passaggi nella prima seduta. Massaggiare energicamente per favorire la penetrazione.



NOTA: I protocolli riportati di seguito costituiscono linee guida generali.

Possono essere personalizzati dal medico in base alle esigenze del paziente e utilizzati in sinergia con altre tecniche come Microneedling o Nanoneedling, PRP, Carbossiterapia, laser PICO. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione dedicata ai protocolli combinati presente nella seconda parte di questo documento.

REVYPEEL® LOW

Protocollo di trattamento:

RIVITALIZZAZIONE DI VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ

ACNE INFIAMMATORIA

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Rivitalizzazione di viso

Rivitalizzazione collo

Rivitalizzazione décolleté

Acne infiammatoria

Rosacea papulo-pustolosa



FREQUENZA

1 seduta a settimana
per 5 settimane



QUANTITÀ

2 ml



FOTOTIPI (FITZPATRICK)

Da I a VI



TEMPO DI CONTATTO

5 – 8 minuti

PROCEDURA

- 1 Indossare guanti in nitrile. Detergere a fondo la pelle.
- 2 Proteggere mucose, zone delicate e lesioni con crema barriera.
- 3 Applicare REVYSKIN PRE PEELING LOTION con un dischetto.
- 4 Prelevare 2 ml di REVYPEEL® LOW forando il tappo grigio. Applicare zona per zona.
- 5 Applicare poche gocce per area e massaggiare con frizione intensa.
- 6 Ripetere l'applicazione fino a ottenere turgore visibile. Generalmente servono 3 passaggi (1-2 su pelli sensibili, fino a 5 su pelli spesse).
- 7 Trattare tutta la superficie evitando le palpebre.
- 8 Lasciare in posa per 5-8 minuti.
- 9 Neutralizzare con acqua fredda e REVYSKIN NEUTRALIZING GEL, quindi risciacquare.
- 10 Applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+.
- 11 Consigliare uso domiciliare quotidiano della stessa crema.



NOTA: Nel trattamento dell'acne attiva, se al termine del ciclo completo di sedute permangono cicatrici acneiche, si raccomanda di eseguire alcune sedute aggiuntive con REVYPEEL® HIGH, focalizzandosi sulle aree cicatriziali residue.

ROSACEA: La rosacea deve sempre essere considerata una condizione cutanea altamente sensibile.

REVYPEEL® LOW può rappresentare un'opzione efficace per la gestione di questa patologia, inclusa la rosacea papulo-pustolosa.

Tuttavia, è fortemente raccomandato non superare i 5 minuti di posa del peeling sull'area interessata.

REVPYPEEL® HIGH

Protocollo di trattamento:

RIVITALIZZAZIONE INTENSA VISO, COLLO, DÉCOLLETÉ

SMAGLIATURE

CICATRICI ATROFICHE (ACNE, VARICELLA)

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Rivitalizzazione intensa viso

Rivitalizzazione collo

Rivitalizzazione décolleté

Smagliature

Cicatrici atrofiche (acne, varicella)



FREQUENZA

ogni 14 giorni per 5 sedute e/o fino al miglioramento della lesione



QUANTITÀ

2 ml



FOTOTIPI (FITZPATRICK)

Da I a III



TEMPO DI CONTATTO

3 - 5 minuti



NOTA: Il trattamento delle cicatrici può essere efficacemente combinato con laser frazionati, Microneedling, Oxyneedling e Carbossiterapia.



AVVERTENZA: Utilizzare REVPYPEEL® HIGH con cautela su pazienti con fototipo IV secondo Fitzpatrick. Si raccomanda di ridurre il numero di passaggi e di limitare il tempo di posa, tenendo conto di una preparazione cutanea preventiva con inibitori della tirosinasi, al fine di limitare il rischio di reazioni avverse.

PROCEDURA

- 1 Indossare guanti in nitrile. Detergere accuratamente la cute e rimuovere ogni residuo di trucco.
- 2 Proteggere le mucose, l'area perinasale, il contorno occhi, eventuali tatuaggi, tagli, lesioni cutanee o lesioni sospette con una crema barriera o vaselina.
- 3 Preparare la pelle imbevendo un dischetto di cotone con REVYSKIN PRE PEELING LOTION e applicarlo uniformemente sulle aree da trattare.
- 4 Prelevare 2 ml di REVPYPEEL® HIGH, forando il tappo grigio con un ago sterile oppure con l'applicatore a punta arrotondata fornito. Applicare la soluzione zona per zona sull'area da trattare.
- 5 Applicare da 1 a 3 gocce di REVPYPEEL® HIGH per ciascuna zona e massaggiare con frizione energica.
- 6 Ripetere l'applicazione fino a osservare un visibile turgore e rimpolpamento della cute. In media sono necessari 3 passaggi per ottenere un risultato evidente.
 - Su collo e aree sensibili, si consigliano 1-2 passaggi.
 - Su cute spessa, si possono effettuare fino a 5 passaggi.
- 7 Proseguire il trattamento zona per zona fino a coprire l'intera area, evitando la zona palpebrale.
- 8 Lasciare agire il prodotto per circa 3-5 minuti per area.
- 9 Iniziare la neutralizzazione del peeling tamponando delicatamente con un dischetto di cotone imbevuto con acqua, effettuando movimenti circolari. Procedere subito con l'applicazione di REVYSKIN NEUTRALIZING GEL, massaggiando con movimenti circolari per attivare il processo di neutralizzazione. Lasciare agire per alcuni minuti, poi risciacquare abbondantemente con acqua fredda.
- 10 Applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+ sulle aree trattate.
- 11 Raccomandare al paziente la prosecuzione del trattamento domiciliare con REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+.

REVYPEEL® LOW | REVYPEEL® HIGH

Protocollo di trattamento:

DISCROMIE E IPERPIGMENTAZIONI

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Discromie

Iperpigmentazioni



FREQUENZA

1 seduta ogni 4 settimane



QUANTITÀ

2 ml



FOTOTIPI (FITZPATRICK)

REVYPEEL® LOW: IV - V

REVYPEEL® HIGH: I - III



TEMPO DI CONTATTO

3 - 5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Nanoneedling: DOPO
il trattamento di
nanoneedling

Microneedling,
Oxyneedling: PRIMA
del trattamento di
microneedling e
oxyneedling




NOTA: L'uso di REVYPEEL® HIGH è consigliato per i fototipi I-III secondo Fitzpatrick, mentre l'uso di REVYPEEL® LOW è consigliato per i fototipi IV-VI.

PROCEDURA

- 1 Indossare guanti in nitrile. Detergere accuratamente la cute ed eliminare ogni residuo di trucco.
- 2 Proteggere le mucose, l'area perinasale, il contorno occhi, eventuali tatuaggi, tagli, lesioni cutanee o lesioni sospette con crema barriera o vaselina.
- 3 Applicare sulla zona da trattare un anestetico topico a base di lidocaina. Rimuoverlo dopo il tempo di posa raccomandato.
- 4 Preparare la pelle imbevendo un dischetto di cotone con REVYSKIN PRE PEELING LOTION e applicarlo uniformemente sulle aree da trattare.
- 5 Prelevare 2 ml di REVYPEEL® LOW o REVYPEEL® HIGH, in base al fototipo cutaneo, forando il tappo grigio con un ago sterile oppure con l'applicatore a punta arrotondata fornito. Applicare la soluzione zona per zona sull'area da trattare.
- 6 Ripetere l'applicazione fino a osservare turgore e rimpolpamento visibili. In media sono necessari 3 passaggi per un risultato evidente:
 - 1-2 passaggi su collo o pelle molto sensibile
 - fino a 5 passaggi su pelle spessa
- 7 Lasciare agire il prodotto per circa 3-5 minuti per area.
- 8 Iniziare la neutralizzazione tamponando acqua con un dischetto in movimenti circolari. Procedere subito con l'applicazione di REVYSKIN NEUTRALIZING GEL, massaggiando con movimenti circolari per attivare la neutralizzazione. Lasciare agire qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente con acqua fredda.
- 9 Eseguire un trattamento di Microneedling, Oxyneedling (con aghi $\leq 0,25$ mm) oppure Nanoneedling sull'area bersaglio, seguendo le tecniche standard.
- 10 Applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+ sulle zone trattate.
- 11 Raccomandare al paziente la prosecuzione della cura domiciliare con REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+



CONTROINDICAZIONI GENERALI PER L'APPLICATION OF REVYPEEL® LOW AND REVYPEEL® HIGH




Melasma



Cheloidi o cicatrici
ipertrofiche




Cute lesa



Allergia nota a uno
dei componenti



Gravidanza e
allattamento



Eruzioni cutanee
attive / Herpes
attivos

Effetti Collaterali Possibili e gestione

- **Esfoliazione intensa:** Può manifestarsi durante le prime applicazioni, soprattutto in presenza di uno strato corneo ispessito. Può durare fino a 10 giorni. Si raccomanda l'applicazione di REVYSKIN POST PEELING CREAM per ripristinare, idratare e riequilibrare la pelle trattata.
- **Sensazione di bruciore intenso immediatamente dopo l'applicazione:** Possibile in soggetti con cute molto sensibile. Sciacquare immediatamente la zona con acqua fredda corrente e applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM.
- **Eritema immediato:** Si risolve generalmente entro poche ore. Si consiglia l'applicazione di REVYSKIN POST PEELING CREAM.
- **Secchezza cutanea eccessiva:** Applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM per idratare, riequilibrare e nutrire i tessuti trattati.
- **Contatto con la congiuntiva:** Risciacquare immediatamente con soluzione fisiologica sterile.
- **Prurito, con o senza eritema, a distanza di alcuni giorni dal trattamento:** Evento molto raro che può indicare una reazione allergica all'acido cogico. In tali casi, considerare la prescrizione di un cortisonico topico.
- **Infiemmazione localizzata tardiva (il giorno successivo):** Si presenta come rossore e/o gonfiore localizzato in un'area trattata. È verosimilmente dovuta a irritazione su cute non completamente integra al momento dell'applicazione. Si raccomanda la prescrizione di un cortisonico topico.
- **Comparsa di chiazze cutanee più scure nei giorni successivi al trattamento:** Dovute a essiccamento di aree di cute ispessita, si risolvono spontaneamente con la desquamazione fisiologica.



NOTA: In caso di effetti collaterali con infiammazione persistente (es. eritema della durata superiore alle 24 ore), soprattutto in soggetti predisposti, sussiste il rischio di iperpigmentazione post-infiammatoria (PIH). Si raccomanda di evitare l'esposizione solare, istruire il paziente sull'uso costante di una protezione solare ad ampio spettro (SPF alto), considerare la prescrizione di inibitori della tirosinasi e/o cortisonici topici.



REVYPEEL® HIGH & LOW

PROTOCOLLI COMBINATI
CON ALTRE TECNICHE

PROTOCOLLI COMBINATI CON ALTRE TECNICHE

Nanoneedling,
Microneedling,
Oxyneedling

Fili in PDO

PRP
(Plasma Ricco di
Piastrine)

Carbossiterapia

Biorivitalizzazione
iniettiva / Botox

IPL
(Luce Pulsata
Intensa)

Radiofrequenza
frazionata

Laserterapia
(PICO, CO₂)

Crioterapia

REVYPEEL® LOW

NANO NEEDLING

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Cheratosi attiniche

Macchie senili

Iperpigmentazioni
post-acneiche



FREQUENZA

1 seduta a settimana per
5 settimane



QUANTITÀ

1 -1,5 ml



FOTOTIPO (FITZPATRICK)

I - VI



TEMPO DI CONTATTO

5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Dopo

PROCEDURA

- 1 Indossare **guanti in nitrile**.
- 2 Detergere accuratamente la pelle.
- 3 Eseguire il trattamento di **nanoneedling** con **movimenti circolari** sulla zona bersaglio e circostante, fino alla comparsa di **lieve eritema**.
- 4 Imbibire un dischetto di cotone con **REVYSKIN PRE PEELING LOTION** e applicarlo sull'area da trattare.
- 5 Prelevare **1 – 1,5 ml di REVYPEEL® LOW**, forando il tappo grigio con l'applicatore arrotondato fornito.
Applicare 1–2 gocce di prodotto sulla zona da trattare e **massaggiare manualmente fino a completo assorbimento**.
Ripetere l'applicazione per un **totale di 3 passaggi**.
Lasciare agire per **5 minuti**.
- 6 Neutralizzare il peeling applicando **REVYSKIN NEUTRALIZING GEL** con un pennello.
Eseguire **movimenti circolari** per favorire l'interazione tra i due prodotti e attivare la neutralizzazione.
Lasciare in posa alcuni minuti, quindi risciacquare con acqua fredda.
- 7 Applicare **REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+** sulle aree trattate.
- 8 Raccomandare l'uso domiciliare continuativo di **REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+**.



MICRONEEDLING e OXY NEEDLING

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Cicatrici atrofiche da acne o varicella

Cicatrici

Smagliature



FREQUENZA

1 seduta ogni 10-15 giorni (su **cute integra e rigenerata**) per un totale di **5-8 sedute**



QUANTITÀ

1 - 1,5 ml



FOTOTIPO (FITZPATRICK)

Da I a VI



TEMPO DI CONTATTO

2 - 5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING:

Prima del trattamento

PROCEDURA

1

Indossare guanti in nitrile.

2

Detergere accuratamente la pelle.

3

Applicare un anestetico topico a base di lidocaina sull'area da trattare. Rimuoverlo dopo il tempo di posa indicato.

4

Imbibire un dischetto di cotone con REVYSKIN PRE PEELING LOTION e applicarlo uniformemente sull'area da trattare.

5

In base all'estensione della zona da trattare, prelevare 1-1,5 ml di REVPYPEEL® HIGH forando il tappo grigio con l'applicatore arrotondato fornito.

Applicare 2-3 gocce e massaggiare manualmente fino a completo assorbimento.

Ripetere l'applicazione per un totale di 3 passaggi.

Lasciare agire per 2-5 minuti.



AVVERTENZE: In pazienti particolarmente sensibili o reattivi, se si verifica disagio al contatto tra REVYSKIN NEUTRALIZING GEL e REVPYPEEL® HIGH, al termine del tempo di posa rimuovere REVPYPEEL® HIGH con una garza imbevuta di acqua fredda.

Successivamente applicare REVYSKIN NEUTRALIZING GEL, massaggiare energicamente per un minuto, e infine rimuovere con un'altra garza imbevuta di acqua fredda.

6

Neutralizzare il peeling applicando REVYSKIN NEUTRALIZING GEL con un pennello, utilizzando movimenti circolari per favorire la miscelazione e attivare la neutralizzazione.

Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare con acqua fredda.

7

Procedere con il trattamento di Microneedling o Oxyneedling, eseguendo movimenti circolari e lineari sulla cicatrice e attorno ad essa.

8

Detergere l'area trattata e applicare garze imbevute di acqua fredda. Se necessario, applicare impacchi di ghiaccio.

9

Applicare una crema cicatrizzante specifica.

10

A partire dal giorno successivo, applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+.

11

Raccomandare l'uso domiciliare continuativo di REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50



Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Lifting con fili
riassorbibili (PDO)



QUANTITÀ

1,5 ml



FOTOTIPO
(FITZPATRICK)

Da I a VI



TEMPO DI CONTATTO

REVYPEEL® LOW: 8 min

REVYPEEL® HIGH: 5 min



QUANDO ESEGUIRE IL
PEELING

Prima dell'impianto dei
fili

PROCEDURA

- 1 Detergere accuratamente la pelle.
- 2 Applicare un **anestetico topico a base di lidocaina** sull'area da trattare. Rimuoverlo dopo il tempo di posa raccomandato.
- 3 Preparare la pelle imbevendo un dischetto di cotone con **REVYSKIN PRE PEELING LOTION** e applicarlo **uniformemente** sull'area da trattare.
- 4 Prelevare **1,5 ml di REVYPEEL® LOW o REVYPEEL® HIGH**, forando il tappo grigio con l'**applicatore arrotondato** fornito. Procedere con l'applicazione **zona per zona**.
- 5 Applicare alcune gocce di prodotto su ciascuna area e **massaggiare vigorosamente con frizione intensa**.
- 6 Ripetere l'applicazione per un **totale di 3 passaggi**.
 - Lasciare in posa per **8 minuti** (con REVYPEEL® LOW)
 - oppure **5 minuti** (con REVYPEEL® HIGH).
- 7 Neutralizzare il peeling applicando **REVYSKIN NEUTRALIZING GEL** con un pennello, effettuando **movimenti circolari** per favorire l'interazione e potenziare l'effetto neutralizzante.
Lasciare agire qualche minuto, quindi **risciacquare con acqua fredda**.
- 8 Applicare **REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+** sulle aree trattate.
- 9 Procedere con l'**impianto dei fili riassorbibili in PDO (polidiossanone)**.
- 10 Al termine della procedura, applicare **impacchi di ghiaccio** sulle aree trattate per alcuni minuti, al fine di **ridurre l'infiammazione e lenire la pelle**.

REVYPEEL® HIGH

PRP (PLASMA RICCO DI PIASTRINE) NEL TRATTAMENTO DELL'ALOPECIA

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Alopecia



QUANTITÀ

0,5 - 1 ml



FOTOTIPO (FITZPATRICK)

Da I a VI



TEMPO DI CONTATTO

10 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Prima – Eseguire il
trattamento con **PRP** il
giorno successivo

PROCEDURA

- 1 Applicare alcune gocce (0,5–1 ml) di REVYPEEL® HIGH sul cuoio capelluto nelle aree colpite da alopecia, **aprendo i capelli a sezioni** per garantire il contatto diretto del prodotto con la cute.
- 2 Eseguire un solo passaggio e massaggiare il prodotto sul cuoio capelluto fino a completo assorbimento.
- 3 Lasciare in posa per 10 minuti.
- 4 Risciacquare con acqua fredda.
- 5 Il giorno successivo, eseguire il trattamento iniettivo con PRP (Plasma Ricco di Piastrine).



REVYPEEL®

REVYPEEL® LOW | REVYPEEL® HIGH

CARBOSSITERAPIA

EFFETTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il trattamento con REVYPEEL® LOW o REVYPEEL® HIGH può essere eseguito prima della carbossiterapia sottocutanea, all'interno della stessa seduta, per potenziare la qualità cutanea complessiva e migliorare la risposta immediata dei tessuti.

Questa sinergia determina un miglioramento visibile della luminosità e del turgore cutaneo.

La successiva applicazione della carbossiterapia, grazie all'aumento della circolazione sanguigna locale e alla stimolazione dei fibroblasti, contribuisce ulteriormente a migliorare l'elasticità della pelle, con un effetto di tonificazione e rassodamento dei tessuti.

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Tutte le indicazioni tipiche della carbossiterapia



QUANTITÀ

Viso: 1,5 ml
Smagliature o corpo:
3,5 ml



TEMPO DI CONTATTO

5 - 10 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Prima – nella stessa seduta

PROCEDURA

- 1 Eseguire il **trattamento completo con REVYPEEL® LOW o REVYPEEL® HIGH**, a seconda dell'area e della condizione da trattare, seguendo il protocollo già descritto.
- 2 Procedere con la seduta di **carbossiterapia**, secondo il protocollo clinico più appropriato.



Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Filler, biorivitalizzazione o tossina botulinica (Botox)



FREQUENZA

1 seduta al mese per un totale di 5 sedute



QUANTITÀ

1 ml



FOTOTIPO
(FITZPATRICK)

Da I a VI



TEMPO DI CONTATTO

REVYPEEL® LOW: 5-8 min

REVYPEEL® HIGH: 5 min



QUANDO ESEGUIRE IL
PEELING

Filler / Biorivitalizzazione:
Prima – nella stessa
seduta

Botox: Prima, almeno
una settimana prima
dell'infiltrazione

PROCEDURA

- 1 Detergere accuratamente la pelle.
- 2 Preparare il tessuto imbibendo un dischetto di cotone con REVYSKIN PRE PEELING LOTION e applicandolo uniformemente sull'area da trattare.
- 3 Prelevare 1 ml di REVYPEEL® LOW o REVYPEEL® HIGH dal flacone, forando il tappo grigio con l'applicatore arrotondato fornito, e procedere con l'applicazione zona per zona.
- 4 Applicare alcune gocce di prodotto per ciascuna zona e massaggiare con frizione intensa.
- 5 Ripetere l'applicazione per un totale di 3 passaggi.
 - Lasciare agire per 5-8 minuti (REVYPEEL® LOW)
 - o 5 minuti (REVYPEEL® HIGH).
- 6 Neutralizzare il peeling applicando REVYSKIN NEUTRALIZING GEL con un pennello, utilizzando movimenti circolari per favorire la neutralizzazione.
Lasciare agire alcuni minuti, quindi risciacquare con acqua fredda.
- 7 Applicare REVYSKIN POST PEELING CREAM SPF 50+ sulle aree trattate.
- 8 Procedere con la biorivitalizzazione iniettiva, eseguendo microiniezioni intradermiche papulari nella stessa area precedentemente trattata con REVYPEEL®.



NOTA: Le infiltrazioni di tossina botulinica (BOTOX) devono essere eseguite in una seduta separata, almeno una settimana dopo il trattamento con REVYPEEL®.

REVYPEEL® LOW ASSOCIATO A IPL

Protocollo in Sintesi:



TEMPO DI CONTATTO

5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Dopo la seduta di IPL

PROCEDURA

- 1 Eseguire la **seduta di IPL** seguendo il protocollo clinico più appropriato in base all'indicazione.
- 2 Procedere con il **trattamento completo con REVYPEEL® LOW**, in funzione dell'area e della condizione da trattare, secondo quanto descritto nel protocollo.

Tempo di contatto: 5 minuti.



NOTA: REVYPEEL® LOW è generalmente ben tollerato dalla pelle di fototipo asiatico. Tuttavia, nei casi ritenuti opportuni dal medico, i pazienti con fototipo Fitzpatrick IV–VI possono essere sottoposti a un pre-trattamento con inibitori della tirosinasi nei due mesi precedenti la procedura di peeling.



REVYPEEL®

REVYPEEL® LOW

RADIOFREQUENZA FRAZIONATA

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Trattamento delle cicatrici oppure da eseguire in ogni seduta di radiofrequenza frazionata (RF microneedling)



TEMPO DI CONTATTO

5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Prima, nella stessa seduta

PROCEDURA

- 1 Eseguire il trattamento completo con REVYPEEL® LOW, in funzione dell'area e della condizione da trattare, secondo quanto già descritto nel protocollo.
Tempo di contatto: 5 minuti
- 2 Applicare un **anestetico topico a base di lidocaina** sull'area da trattare. Rimuoverlo dopo il tempo di posa appropriato.
- 3 Eseguire la seduta di radiofrequenza frazionata (fractional RF) secondo il protocollo clinico più adatto.



REVYPEEL®

REVYPEEL® LOW

ASSOCIATO A TERAPIE LASER

Il protocollo REVYPEEL® LOW può essere **perfettamente combinato dopo diverse terapie laser**, in base alle seguenti indicazioni:

LASER	INDICAZIONE	Seduta di REVYPEEL® LOW (prima o dopo)
IPL	ROSACEA	DOPO
LASER PICO	PIGMENTAZIONI / RINGIOVANIMENTO	DOPO
LASER CO ₂	CICATRICI	CONTROINDICATO



NOTA: In caso di cicatrici, si raccomanda l'utilizzo di REVYPEEL® in combinazione con microneedling nei pazienti che non desiderano sottoporsi a trattamenti laser o che presentano fototipi scuri, per i quali il laser è controindicato.

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

IPL: Rosacea

LASER PICO:
Pigmentazioni /
Ringiovanimento

LASER CO₂: Cicatrici



TEMPO DI CONTATTO

5 minuti



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Dopo la seduta laser

L'associazione con laser
CO₂ non è raccomandata
in combinazione con
REVYPEEL®.

PROCEDURA

- 1 Eseguire la seduta laser secondo il protocollo clinico più appropriato in base all'indicazione e alla zona da trattare.
- 2 Procedere, **nella stessa seduta**, con il **trattamento completo con REVYPEEL® LOW**, in base all'area e alla condizione clinica, seguendo il protocollo precedentemente descritto.
Tempo di contatto: 5 minuti.



AVVERTENZA - Fototipi Fitzpatrick IV-VI:

Per i fototipi cutanei scuri (IV-VI), si raccomanda un **pre-trattamento della pelle per 2-3 mesi** con agenti depigmentanti come **idrochinone o arbutina**, al fine di ridurre il rischio di pigmentazioni post-trattamento o fenomeni infiammatori.

REVYPEEL® HIGH

ASSOCIATO A CRIOTERAPIA

Protocollo in Sintesi:



INDICAZIONI

Lentigo solari

Cheratosi attiniche



QUANDO ESEGUIRE IL PEELING

Prima del trattamento

PROCEDURA

- 1 Eseguire un **trattamento completo con REVYPEEL® HIGH**, in base all'area e alla condizione da trattare, seguendo il protocollo precedentemente descritto.
- 2 Procedere con la **seduta di crioterapia**, secondo il **protocollo clinico più appropriato**.



REVYPEEL®